



XXXIX REUNIÓ ANUAL SOCIETAT CATALANA DE NEFROLOGIA

26 i 27 de maig de 2023

Universitat Pompeu Fabra
Barcelona School of Management
Auditori, Edifici Balmes



PRURITO EN HEMODIÁLISIS EN UN HOSPITAL COMARCAL: ESTUDIO

Roxana Bury Macias, Alicia Molina; Roxana Bury; Judith Cacho; María Cufi; Montserrat Picazo; Laura Salveti; Raquel Bretón;
Merce Alegri; Alicia Rey; Marc Cuxart

Hospital de Figueres

El prurito un síntoma poco reconocido en los pacientes en hemodiálisis. Según reportes tiene prevalencia 28 a 90%, y en 40% un síntoma moderado a severo. Presentamos la prevalencia y percepción del prurito de hemodiálisis en un hospital comarcal

Objetivo El propósito es caracterizar prurito en nuestros pacientes en programa hemodialisis y poder implementar estrategias para tratarlo

Materiales y métodos

Estudio observacional descriptivo que incluye pacientes en programa crónico de hemodialisis (mas 120 días en HD) a los que se les pasó encuesta de síntomas según escalas SADS y Wi NRS. Se recogieron datos: Sexo, edad, hemoglobina, ferritina, albumina, calcio, PTH, fosforo, 25 OH hidroxicolecalciferol, tipo de hemodiálisis, acceso vascular, tratamiento con paricalcitol, etelcalcetide, quelantes de fósforo, antihistamínicos, antidepressivos, gabapentina/pregabalina

Se excluyó a quienes presentaban barrera idiomática y los que tenían menos de 120 días de hemodiálisis.

Resultados

Características basales N=68; Edad (años) 69,5 (56.5-80); Media KT 6 sesiones 49.3+/-7.6; Tiempo en diálisis (meses) 23 (10.25-53.25); Calcio 9.2+/-0.63; P 4.9+/-1.72;

PTH

250.6 (120.35-447)

Ferritina

438 (201.33-653.1)

Sexo (% varones) 45 (66.2) DM

39 (57.4) FAVIs 42 (61.8)

Prurito aparece en 27 pacientes (39.7%)

ESCALA SADS LEVE: 13 (48%)

MODERADO: 11 (40.7)

GRAVE: 3 (11.1)



XXXIX REUNIÓ ANUAL SOCIETAT CATALANA DE NEFROLOGIA

26 i 27 de maig de 2023

Universitat Pompeu Fabra
Barcelona School of Management
Auditori, Edifici Balmes



ESCALA WIW-NRD LEVE (1-3): 10 (37%)

MODERADO (4-6): 9 (33%)

GRAVE (>6): 8 (30%)

Se realizó regresión logística en factores relacionados con la aparición de prurito: edad, tiempo en diálisis, acceso vascular, media KT, toma de quelantes, niveles de fósforo, tratamiento pregabalina/gabapentina, antidepresivos. La edad se relacionó de forma indirecta con el prurito: Edad en los que tienen prurito: 58 (43-74). Edad en los que no tienen: 74 (66.5-82.5) OR: 0.936 (0.896-0.978), P= 0.003

Percepción del prurito en los pacientes por parte del personal sanitario: médicos 25% enfermería 15%

Conclusiones

En nuestro estudio el prurito es más prevalente en los pacientes que la percepción del personal sanitario y aparece más en los jóvenes.