



XXXIX REUNIÓ ANUAL SOCIETAT CATALANA DE NEFROLOGIA

26 i 27 de maig de 2023

Universitat Pompeu Fabra
Barcelona School of Management
Auditori, Edifici Balmes



UN ABANS I UN DESPRÉS A LA ONCONEFROLOGIA

Jehimy Jean Alvarez Saltos, Ana Merino Ribas, Mara Lisbet Cabana Carcasi, Nadia Martin Alemany, Joaquim Bosch Barrera, Leyre García Cantalejo, Laura Boix Soler, Gabriel Manuel González Suárez, Cristina Noboa Páez, Claudia Marcela Castillo Devia, Yanel Adr

HOSPITAL UNIVERSITARI DR JOSEP TRUETA DE GIRONA

Objectius: Descriure l'evolució en els tractaments oncològics i el seu impacte en l'afectació renal.

Materials i mètodes: Estudi retrospectiu observacional analitzant les biòpsies renals realitzades del 2014 al febrer 2023 dels pacients amb diagnòstic de neoplàsia.

Resultats:

Es van comparar 6 pacients biopsiats del 2014 al 2018 (grup A) amb 22 pacients biopsiats del 2019 a febrer 2023 (grup B). Al grup A l'edat mitjana era $68,5 \pm 7,1$ anys i al B $70,7 \pm 7,1$. Al grup A s'observava predominantment dones (66,7%), mentre que al B hi havia majoria d'homes (81,8%). Al grup A s'observà major proporció de pressa d'estatines i àcid acetil-salicílic respecte al B (83,3% vs. 31,8%, $p=0.024$; 33,3% vs. 4,5%, $p=0.043$). Al moment de la biòpsia, la majoria dels pacients del grup A estaven lliures de malaltia (66,7%); mentre que al grup B, es trobaven majoritàriament estables (50%) ($p<0.001$). Al grup A totes les nefropaties foren causades per un factor aliè a la neoplàsia, mentre que al grup B el 63.6% foren secundàries al tractament oncològic ($p=0.003$). Al grup A s'observà un major temps des del diagnòstic oncològic fins la mort respecte el B ($3033 \pm 1889,09$ dies vs. $692 \pm 719,47$ dies, $p=0.012$). Pel que fa a la funció renal al moment de la biòpsia, observem al grup A una funció renal normal o estable (66,7%), i al grup B major freqüència de deteriorament de la funció renal (77,3%), ($p=0.041$); amb creatinina de $1,82 \pm 0,68$ al grup A vs. $3,95 \pm 2,48$ al B, ($p=0.049$). Finalment, les biòpsies renals del grup A mostraven en un 16,7% necrosis tubular aguda i nefritis tubulointerstitial aguda o crònica, mentre que al grup B vam observar les troballes esmentades al 81,8% ($p=0.002$).

Conclusions: Amb la introducció dels nous antineoplàsics, el concepte de nefropatia als pacients oncològics ha canviat radicalment. Es requereix un abordatge diferent i una major especialització en aquest camp.